

Opolska "c" Krystyny
Boratyniec Ruski 66
ur. 03.06.07r.

Siemiatycze dn.09.06.07r.

SAMODZIĘLNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W SIEMIATYCZACH
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8
tel. (0 85) 655 28 40, REG. 050653402

10130-90-90-09E00-00-01

Epikryza

Noworodek płci żeńskiej ,rodziców młodych zdrowych ,z ciąży III o przebiegu prawidłowym. Urodzony w dn. 03.06.07r. Przebieg porodu bez powikłań ,poród o czasie, dziecko urodzone drogami i siłami natury z 9-ma pkt. w skali Agar – waga urodzeniowa-3.650.Smółke i mocz oddało .Ze względu na zielone wody płodowe , małą żywotność dziecka oraz okresowe zaburzenia oddychania(nieznaczne zaciąganie dolnych m.żebry)do leczenia włączono Pipril .Od trzeciej doby życia zaobserwowano żywą perystaltykę jelitową , wzdęcie powłok brzusznych . W wykonanym usg jamy brzusznej stwierdzono dużą ilość gazów w jelitach , w niektórych jelitach płynną przelewającą się treść .Noworodek oddawał stolec (ostatni w dniu dzisiejszym) ,powłoki jamy brzusznej nadal wzdęte , perystaltyka nasilona, żywa. W dniu dzisiejszym ok. godz. 19-tej dziecko zaczęło gwałtownie ulewać żółtą treścią ,nasiliło się wzdęcie powłok brzusznych . W wykonanym usg stwierdzono jn.. Po ustaleniu miejsca, noworodka przekazano karetką „N” do Oddziału Chirurgii Dziecięcej DSK w Białymstoku.

Badania dodatkowe:

Morf.: WBC-27.8 RBC-4.03 HGB-14.3 HCT-41.3 MCHC-34.5 PLT-283

Morf.II: WBC-25.7 RBC-4.35 HGB-15.6 HCT-48.4 MCHC-32.2 PLT-246

CRP –(-) ujemne 2x

Kreatynina – 0.96mg/dl Mocznik-31.2mg/dl

Glukoza 44.mg/dl , 80mg/dl , 72mg/dl , 130mg/dl

Usg jamy brzusznej (05.06.07r.) : Duża ilość gazów w jelitach utrudniająca badanie – brzuch wzdęty. Wątroba widoczna prawie w całości , jednorodna , normoechogeniczna .Pęcherzyk żółciowy obkurczony , bez zmian w jego polu. Drogi żółciowe śródwątrobowe nieposzerzone. PŻW trudny do oceny , bez ewidentnego poszerzenia. Trzustka widoczna słabo , fragmentarycznie , bez uchwytnych zmian w jej polu. Śledziona w normie. Nerki o normalnym do wieku obrazie , bez poszerzenia UKM-ów. Pęcherz moczowy opróżniony nie do oceny. Wolnego płynu w jamie brzusznej nie wykazano. W niektórych jelitach płynna przelewająca się treść.

Usg jamy brzusznej (09.06.07r.):Duża ilość gazów jelitowych utrudniających badanie-brzuch wzdęty. Wątroba widoczna prawie w całości , jednorodna , normoechogeniczna. Pęcherzyk żółciowy obkurczony. Trzustka widoczna jedynie w zakresie trzonu. Śledziona niewidoczna. Nerki całkowicie zasłonięte gazami jelitowymi. Zwracają uwagę liczne, wypełnione płynną i gazową treścią jelita, dość szerokie , słabo perystaltujące , przelewaniem się treści. W żołądku znaczna ilość płynnej i gazowej treści. Wskazana dalsza diagnostyka ,obserwacja kierunku niedrożności jelit

Leczenie: inkubator + tlen(3l/min) do 3 doby życia , Pirpil (ostatnie podanie o godz. 20.00 w dniu dzisiejszym) , Vit C , 10% Sulfacetamid , Detreomycyna ung.opht. , 5% Glukoza.

lek. med. Mieczysław Sitnik
specjalista chirurgii dziecięcych
specjalista w dyscyplinie ratunkowej
06.06.2007